

PORÓWNANIE **ESWT** Z LECZENIEM CHIRURGICZNYM HIPERTROFICZNEGO BRAKU ZROSTU KOŚCI DŁUGICH

TERAPIA POZAUSTROJOWĄ FALĄ UDERZENIOWĄ W PORÓWNANIU Z LECZENIEM CHIRURGICZNYM HIPERTROFICZNEGO BRAKU ZROSTU KOŚCI DŁUGICH

Cacchio A, Giordano L, Colafarina O, Rompe JD, Tavernese E, Ioppolo F, Flamini S, Spacca G, Santilli V.

1. Zakład Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji

2. Oddział Chirurgii Ortopedycznej, Oddział Chirurgii, Szpital "San Salvatore" w Vaquila

3. Centrum Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji, Szpital Nomentana w Rzymie

4. Oddział Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji, Szkoła Medyczna Uniwersytet "La Sapienza", Rzym, Włochy

Opublikowano: The Journal of Bone & Joint Surgery, 91(11), 2589-2597.

PRZEGLĄD

- 126 pacjentów z brakiem zrostu kostnego
- Porównanie efektów leczenia operacyjnego z terapią FSWT w hipertroficznym braku zrostu kości długich
- FSWT w porównaniu z leczeniem operacyjnym
- Badanie RTG
- FSWT jest tak samo skuteczne, jak operacja podczas 3- oraz 12-miesięcznej obserwacji

WSKAŹNIK POPRAWY ZROSTU KOŚCI

